

Enzyme

Natürliche Verdauungshelfer –
für ein leichtes Bauchgefühl



Enthaltene Enzyme

- Bromelain:** Eiweiß spaltendes Enzym, kann z. B. Fibrin abbauen
- Papain:** Eiweiß spaltendes Enzym
- Protease:** Eiweiß spaltendes Enzym
- Lipase:** baut komplexe Fette zu freien Fettsäuren ab
- Lactase:** baut Milchzucker (Lactose) ab – z. B. bei Lactoseintoleranz!
- Amylase:** spaltet Zuckermoleküle aus komplexen Kohlenhydratverbindungen ab
- Nattokinase:** kann Fibrinstrukturen abbauen

Weitere interessante Inhaltsstoffe

- Kümmel:** ist eines der ältesten Gewürze der Welt. Arzneipflanze des Jahres 2016!
- Yamswurzel:** enthält natürlicherweise Diosgenin, welches eine ähnliche Grundstruktur wie eine Reihe von Hormonen besitzt
- Rotkleeextrakt:** enthält unter anderem Isoflavone, die auch als Phytoöstrogene bezeichnet werden.
- Löwenzahn:** hat aufgrund der enthaltenen Bitterstoffe einen kräftigen Eigengeschmack.
- Streptococcus thermophilus:** natürlicher Vertreter in unserem Verdauungstrakt.


Enzyme & Pflanzenextrakte

Als natürliche Verdauungshelfer sind unzählige hochspezialisierte Enzyme an der Zerkleinerung unserer Nahrung beteiligt. hypo-A Enzyme enthält ein breites Spektrum von Enzymen, die auf den Abbau von Eiweißen, Fetten, Kohlenhydraten und Milchzucker spezialisiert sind: Bromelain, Papain, Protease, Lipase, Lactase, Amylase und Nattokinase. Sie alle werden in hypo-A Enzyme geschickt mit ausgewählten Pflanzenextrakten und Streptococcus thermophilus – als natürlichem Vertreter unserer Darmflora – kombiniert.

Enzyme bei Lactoseintoleranz

Die in hypo-A Enzyme enthaltene Lactase hilft dem Körper beim Abbau von Lactose. Zwei Kapseln hypo-A Enzyme enthalten 10.000 FCC-Einheiten dieses Enzyms.

Bei Personen, die Probleme mit der Verdauung von Lactose haben, verbessert Lactase die Lactoseverdauung. Da es Unterschiede bei der Lactosetoleranz gibt, sollten sich Betroffene zusätzlich bezüglich der Funktion der Lactase für ihre Ernährung beraten lassen.



Verzehrempfehlung Enzyme

2 Kapseln täglich mit etwas
Wasser zu einer Mahlzeit

Bei Bedarf kann die Versorgung mit hypo-A Enzyme nach Rücksprache mit Ihrem Therapeuten oder Apotheker an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Falls Sie z. B. unter Laktoseintoleranz leiden, zu einem unangenehmen Gefühl im Bauch neigen oder bei Kantinenkost und Fast Food kann eine individuelle Anpassung sinnvoll sein – z. B. je eine Kapseln in der Mitte einer kleineren Mahlzeit und zwei Kapseln mit etwas zeitlichem Abstand während der Hauptmahlzeit.